

Size: 210 x 297 (W x H mm)

CMYK: YES
Pantone®: P285

matholding group

TAKING CARE OF CROPS

www.iqvagro.com

BORMIX WP

FUNGICIDA - BACTERICIDA POLVO MOJABLE (WP)

BORMIX WP, es fungicida bactericida de contacto con acción preventiva. Este fungicida posee un amplio espectro de acción en el control preventivo de enfermedades que se indican en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Caldo Bordelés* 71,97 % p/p (719,7 g/kg).

Coformulantes, c.s.p. 100% p/p (1 kg).

*Mezcla de hidróxido cálcico y sulfato cúprico (equivalente a 20% Cu p/p (200 g Cu/kg)).

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Nº 2.970

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Caldo Bordelés pertenece al grupo químico de los Compuestos de Cobre.

BORMIX WP, es un fungicida bactericida en base a Sulfato Cuprocálcico. Durante su preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. En su aplicación usar equipo de protección que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar guantes de hule, traje protector de goma, botas impermeables de hule, antiparras y mascarilla con filtro. No permitir el ingreso ni la manipulación de terceras personas en áreas que están siendo sometidas a tratamientos. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación. Después de su uso, lavar el equipo aplicador con abundante agua, cuidando de no vaciar su contenido en fuentes de agua.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de envenenamiento son: Dolor ardiente e irritante en la boca y faringe, náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas, disminución de la tensión arterial.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

Inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Ingestión: **NO INDUCIR VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:

Realizar tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO:

El tratamiento médico debe ser sintomático; efectuar lavado gástrico. Administrar BAL, EDTA o PENICILAMINA.

ECOTOXICIDAD:

Tóxico en peces y otros organismos acuáticos, baja toxicidad en aves, no tóxico en abejas. No vertir o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de Emergencia:

RITA CHILE (2) 777 1994 / 2735 5863

Conservar el producto en sus envases originales, bien cerrados y bajo llave.

NOTA AL COMPRADOR:

Como el almacenamiento y aplicación práctica junto a una serie de otros factores que influyen en el éxito del empleo del producto, escapan totalmente a nuestro control, no podemos dar garantía alguna respecto de los resultados que se obtengan de su utilización. Por consiguiente, los riesgos del uso y manejo de este producto son de cuenta exclusiva del usuario, cualquiera que fuese el método de aplicación que se emplee. Garantizamos la calidad óptima e invariable y el porcentaje de contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo.

BORMIXWP 25K-ANY CL(0)

Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 25kg

Importado y Distribuido por:

IQV Chile SPA

Fabricado por:
Industrias Químicas del Vallés, S.A.
Avda. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallés
Barcelona, España.



matholding group



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

BORMIX WP, es un fungicida bactericida de amplio espectro, recomendado para el control preventivo de las enfermedades de las siguientes especies.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS g/100 L de agua	OBSERVACIONES
Naranja, Limonero, Mandarino, Pomelo, Tangelo	Podrición parda de los frutos (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	200 - 400	Realizar hasta 3 aplicaciones con intervalos de 25-30 días a comienzos de otoño o inmediatamente después de las primeras lluvias. Mojamiento 2.000 a 3.000 L de agua/há.
Almendro, Cerezo, Ciruelo, Guindo, Damasco, Duraznero, Nectarino, Plumcot	Moniliasis, Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	500 - 750	Realizar 3 aplicaciones en forma preventiva a inicios, 50% y 100% de caída de hojas. Repetir 2 aplicaciones desde yema hinchada, hasta botón floral con un intervalo de 8-10 días según condiciones climáticas. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Uva vinífera Uva de mesa	Mildió (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 - 750	Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada desde inicios de brotación con intervalos de 7 a 10 días, mientras persistan condiciones de infección (lluvias). No aplicar durante floración. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Manzano	Cancro europeo (<i>Nectria galligena</i>), Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i>)	500 - 750	Realizar 1 a 2 aplicaciones por temporada durante la caída de hojas. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Peral	Tizón bacteriano (<i>Pseudomonas syringae</i>)	500 - 750	Realizar 2 aplicaciones por temporada, una a caída de hojas y la segunda en yema hinchada. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Nogales	Peste negra (<i>Xanthomonas arboricola</i> PV. <i>Juglandis</i> = <i>X. campestris</i> PV. <i>Juglandis</i>)	1er Tratamiento 500 - 750 2º - 4º Tratamiento 300 - 400	Realizar 4 aplicaciones, la primera a inicios de brotación, la segunda a inicios de floración, la tercera con un 15%-50% de flor pistilada y la cuarta aplicación al término de la floración. Mojamiento 2.000 a 2.500 L de agua/há.
Tomates, Papas	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> *)	Kg/há. 1.0 - 3.0	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas y repetir a los 10-15 días según condiciones de infección. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada. Mojamiento 400 a 600 L/há.

*Tipo de Apareamiento: A1

NOTA: Utilizar la dosis mayor en condiciones de alta presión de la enfermedad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si es usado en los cultivos y de acuerdo a la forma y dosis que en esta etiqueta se indican. Se debe tener precaución en condiciones frías y húmedas, ya que se incrementan problemas de fitotoxicidad, especialmente en variedades de perales (D'anjou y Packam's Triumph).

COMPATIBILIDAD

BORMIX WP, es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común.

INCOMPATIBILIDAD

BORMIX WP, es incompatible con aquellos productos de marcada acción ácida o alcalina.

TIEMPO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de terminada la aplicación, para personas y animales.

CARENCIA

3 días en Naranja, Limonero, Mandarino, Pomelo, Tangelo. 7 días en Vid. 3 días en Tomate. 3 días en Papas. Almendro, Cerezo, Ciruelo, Guindo, Damasco, Duraznero, Nectarino, Plumcot, Manzano, Peral y Nogales no procede Periodo de Carencia por el momento en el que se realizan las aplicaciones.

BORMIXWP 25K REV CL/01

**CUIDADO**