

Santiago, 09 de mayo de 2022

SEÑOR:

RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sr. Juan Rodrigo Sotomayor, Jefe del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida ACETAMIPRID 20% SP, Insecticida, ingrediente activo Acetamiprid, formulado como polvo soluble (SP) al 20% p/p, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1873 para el control de *Lobesia* en frutos de *Prunus salicina* y *Prunus domestica* en Chile.

AGROSPEC S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida ACETAMIPRID 20% SP, numero de autorización SAG 1873, para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de ciruelo japonés y europeo.

ACETAMIPRID 20% SP para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado, hasta 3 veces durante la temporada, desde caída de pétalos hasta precosecha dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de ACETAMIPRID 20% SP para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Tipo de conducción	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electrostática	Período de protección por aplicación (días)
<i>Prunus salicina</i>	50	No se recomienda	No se recomienda	18
<i>Prunus domestica</i>	50	No se recomienda	No se recomienda	18

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de ACETAMIPRID 20% SP: viento excesivo (mayor a 8 km/hr) ni altas temperaturas (mayores a 28°C). En caso de lluvias por sobre los 25 mm se recomienda repetir aplicación.

ACETAMIPRID 20% SP debe ser aplicado en el momento de MÁXIMA ECLOSIÓN DE HUEVOS dirigiendo la aspersión a frutos para el control de LARVAS, de todos los estados de desarrollo.



Considerar que ACETAMIPRID 20% SP es ligeramente toxico para abejas y no se cuenta con antecedentes que midan la toxicidad para enemigos naturales.

ACETAMIPRID, ingrediente activo de ACETAMIPRID 20% SP, corresponde a un insecticida sistémico con actividad translaminar y posee una acción por contacto y estomacal y su mecanismo de acción está clasificado como larvicida-neurotóxico.

ACETAMIPRID tiene tolerancia en ciruelo en Chile según se indica en el cuadro siguiente:

Ingrediente activo	Ciruelo (ppm)	Período de Carencia (días)	Fuente
Acetamiprid	0,2	5	Resolución N°892 de 2020

Para Chile la carencia es de 5 días y el período de reingreso es de 24 horas.

Macarena Madariaga P
Gerente Asuntos Regulatorios
Agrospec S.A.