



We create chemistry

# Juwel<sup>®</sup> Top

## Fungicida Suspo-Emulsión (SE)

Fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de enfermedades foliares y en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Composición:

Fenpropimorfo*	15% p/v (150 g/L ≈ 140 g/kg)
Kresoxim-metilo**	12,5% p/v (125 g/L ≈ 117 g/kg)
Epoxiconazol***	12,5% p/v (125 g/L ≈ 117 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/v (1 L)

\*cis-4-[(RS)-3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina.

\*\**(E)*-metoxiimino[2-(*o*-toliloximetil)fenil]acetato de metilo.

\*\*\**(2 RS, 3 SR)*-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1*H*-1,2,4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2515

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: ..... Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

**BASF S E**

D-67056 Ludwigshafen, Alemania

**BASF Española**

Ctra Nacional 340 km 1156, 43006 Tarragona, España

**BASF Agri-Production S.A.S.**

Zone Industrielle Lyon Nord, Rue Jacquard, 69727 Genay Cedex, Francia

Importado y Distribuido por

**BASF Chile S.A.**

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: (56) 22640 7000

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E

© Marca Registrada de BASF



**CUIDADO**





# Juwel® Top

## INSTRUCCIONES DE USO

### Generalidades

**Juwel® Top**, fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante, controla las principales enfermedades foliares en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

## CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones Terrestres y/o Aéreas			
Cultivos	Enfermedad	Dosis L/ha	Observaciones
Trigo (blancos y canchales), cebada, triticale, centeno	Royas o polvillos ( <i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. coronata</i> ). Escaldadura de la cebada ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ). Helmintosporiosis ( <i>Pyrenophora graminea</i> , <i>P. teres</i> , <i>P. tritici-repentis</i> y <i>Cochliobolus sativus</i> ). Septoriosis ( <i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Septoria nodorum</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ). Mancha ocular ( <i>Tapesia yellundae</i> ).	0,8 a 1,0	Aplicar de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta, respetando los periodos de carencia. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30°C). Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha. Utilizar la dosis mayor en condiciones de alta presión de las enfermedades. Aplicaciones por temporada: máximo 2. Aplicaciones por temporada para trigo, triticale y centeno: máximo 2, para cebada: máximo 1.

### Preparación de la mezcla

Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Juwel® Top**. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

### Incompatibilidad

No se conocen incompatibilidades específicas.

### Compatibilidad

**Juwel® Top** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común en los cultivos recomendados. En caso de dudas, consultar a nuestro Departamento Técnico. Para favorecer la penetración y cubrimiento, **Juwel® Top** puede ser mezclado con el coadyuvante Break. Para mezclas en aplicaciones aéreas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

# Juwel® Top

## Fitotoxicidad

En cereales, no mezclar **Juwel® Top** con herbicidas sulfonil ureas ó flucarbazona-sodio por posible fitotoxicidad al cultivo. Evite la deriva de **Juwel® Top** sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de **Juwel® Top** no produce fitotoxicidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria, maíz y raps.

## Períodos de Carencias

Respetar una carencia de 80 días para cebada y 60 días para trigo, triticale y centeno. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

## Tiempo de Reingreso

Para personas, 2 horas de espera es suficiente. que es cuando se estima que el depósito aplicado se ha secado.

El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

## Nota:

Con el uso repetido de **Juwel® Top** o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Juwel® Top**, obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones (máximo 2), emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción, o alternarlo con otros fungicidas de diferente composición química o modo de acción, considerando que **según clasificación FRAC**, los ingredientes activos de **Juwel® Top**, Fenpropimorfo, Kresoximmetilo y Epoxiconazol pertenecen a los grupos G2, C3 y G1, respectivamente.



CUIDADO

