

PROPIZOL® 25 EC

FUNGICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.514

PROPIZOL® 25 EC, fungicida sistémico, de amplio espectro, eficaz en el control preventivo y curativo de enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Propiconazol	25% p/v (250 g/l)
Cofomulantes, c.s.p	100% p/v (1 l)
(2RS,4RS,2RS,4RS)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA – CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China

ZIP: 324400

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

INFLAMABLE - NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PROPIZOL® 25 EC, fungicida cuyo ingrediente activo propiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante aplicaciones vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

No aplicar con viento mayor a 5 m/seg y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

PROPIZOL® 25 EC es ligeramente tóxico para peces, extremadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para Triple Lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento Médico de Emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia, luego retirarlas y continuar con el lavado hasta completar 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco, si es necesario dar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Acudir inmediatamente a un centro asistencial. **En todos los casos** llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta o envase del producto al profesional de la salud a cargo. **Síntomas probables:** Irritación de piel y ojos. Náuseas, vómitos, dolor de cabeza.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conservar **PROPIZOL® 25 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y adecuadamente exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, procedase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E. I.



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

PROPIZOL® 25 EC, fungicida sistémico, de amplio espectro.

Cuadro de Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencias (días)
Cereales (avena, cebada, centeno, maíz y trigo)	Royas Roya (<i>Puccinia graminis</i>), Roya (<i>Puccinia triticina</i>), Roya amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>), Roya coronada (<i>Puccinia coronata</i>), Roya de la hoja (<i>Puccinia hordei</i>), Oídio, Septoriosis (<i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Stagonospora avenae</i> , <i>Leptosphaeria avenaria</i>), <i>Helminthosporium</i> , Rincosporiosis	0,5	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad fungosa. Para el caso específico del trigo, se recomienda que en el control de <i>Septoria</i> , se aplique a partir del 2° nudo. No aplicar más de 3 veces por temporada, repitiendo al reaparecer los síntomas.	30
Duraznero, Nectarino, Almendro, Ciruelo, Cerezo, Damasco	Moniliasis (<i>Monilia laxa</i> , <i>Monilinia fructicola</i>) Roya o polvillo de los frutales (<i>Tranzschelia discolor</i>)	0,5	Aplicar al inicio de flor y en plena flor. Aplicar antes que aparezcan los síntomas, desde mediados de noviembre, y repetir dos veces a intervalos de 3-4 semanas	3 Almendro 53
Damasco, Duraznero, Nectarino	Oídio	0,5	Aplicar al inicio de la caída de pétalos y repetir hasta endurecimiento de carozo. No aplicar más de 3 veces por temporada, repitiendo cuando vuelvan a aparecer los síntomas.	3
Duraznero, Nectarino	Putridión Ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	50 cc/100 Lt de agua Aplicar un mínimo de 500 cc/ha	Aplicar 5 a 7 días antes de la cosecha. En caso de cosechas largas se puede repetir la aplicación cada 7 a 10 días. No aplicar más de 2 veces por temporada.	3
Apio	Septoriosis (<i>Septoria apiicola</i>)	0,5	Iniciar las aplicaciones cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. No aplicar más de 2 veces por temporada, repitiendo cuando vuelvan a aparecer los síntomas.	58

Cuadro de instrucciones de uso Aplicación Aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencias (días)
Cereales (avena, cebada, centeno, maíz y trigo)	Royas Roya (<i>Puccinia graminis</i>), Roya (<i>Puccinia triticina</i>), Roya amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>), Roya coronada (<i>Puccinia coronata</i>), Roya de la hoja (<i>Puccinia hordei</i>), Oídio, Septoriosis (<i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Stagonospora avenae</i> , <i>Leptosphaeria avenaria</i>), <i>Helminthosporium</i> , Rincosporiosis	0,5	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad fungosa. Para el caso específico del trigo, se recomienda que en el control de <i>Septoria</i> , se aplique a partir del 2° nudo. Mojamiento 40 L/ha. No aplicar más de 3 veces por temporada, repitiendo cuando vuelvan a aparecer los síntomas.	30

Instrucciones de uso: Puede aplicarse con cualquier equipo. Para frutales aplicar con volúmenes de agua entre 1000 y 2000 litros/hectárea dependiendo del tamaño de los árboles y el desarrollo vegetativo. En apio aplicar con volúmenes de agua entre 200 y 400 litros/hectárea.

Compatibilidad: **PROPIZOL® 25 EC** es compatible con la mayoría de los insecticidas y herbicidas de uso común.

Incompatibilidad: Incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **PROPIZOL® 25 EC**, previamente disuelto y homogenizado en agua, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado, tanto para personas como animales.

