

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

**GRUPO QUIMICO:** Quinoxifeno pertenece al grupo químico de las quinolinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y ojos. Durante la preparación del producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**ALMACENAJE:** Almacenar bajo llave, en lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. No exponga al calor o llama. No almacenar junto con alimentos, forrajes ni semillas.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Puede producir irritación ocular con daño a la córnea. Puede causar una reacción alérgica en la piel de individuos sensibles.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si hay irritación, consulte a un médico. En caso de Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si hay irritación, consulte a un médico. En caso de Ingestión: No provocar el vómito. No dar leche ni grasa. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de Inhalación: Sacar al afectado al aire fresco. En caso de molestia, consulte a un médico. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial.

**TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:** Lavado gástrico, carbón activado. Control del calcio serico. Diazepan si existen convulsiones. Azul de metileno si hay metahemoglobinemia. Evitar estimulantes. Realizar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**EN CASO DE INGESTION O INTOXICACION LLAMAR AL (2) 2635 3800, CONVENIO CITUC/AFIPA O AL (2) 2247 3600 CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS, EN CASO DE ACCIDENTE. TELÉFONOS DE EMERGENCIA - ATENCION LAS 24 HORAS. CONSULTAS GOWAN CHILE S.P.A: +5632 2860 698**

**Información Ecotoxicológica:** Quintec® es tóxico para invertebrados acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves, peces y abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO**

**Instrucciones para triple lavado:** Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciado el envase; agregue agua hasta ¼ de su capacidad, cierre y agite durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces. Posteriormente, perforo el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centros de acopio autorizados.

**Gowan**

# Quintec

**FUNGICIDA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición**

Quinoxifeno\* 25 % p/v (250 g/L)  
Coformulantes, c.s.p 100% p/v (1L)

\*Éter 5,7-dicloro-4-quinolil 4-fluorofenilico

**Quintec®** es un fungicida preventivo con capacidad de redistribuirse en follaje y frutos. Pertenece a un nuevo grupo químico, las quinolinas, indicadas para el control de oídio en vides. **Quintec®** interfiere con los procesos de pre infección del oídio (germinación y/o formación apresorios), por lo que el patógeno no alcanza a producir daño alguno. Su modo de acción diferente lo convierte en una valiosa herramienta para prolongar la vida útil de los fungicidas disponibles.

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.442 N° Lote y fecha vencimiento:** ver envase

**Fabricante:** Dow AgroSciences Europa: BP 1220 – 790 Avenue du Docteur Donat 06254, Mougins, Francia; Dow AgroSciences Europa: Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Hertsfordshire SG5 1NH, Inglaterra; E.I. Du pont de Nemours and Co.: Valdosta Manufacturing Center: 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, GA 31602, Estados Unidos; Dow AgroSciences LLC - Planta Helena Industries LLC: 434 Fenn Road, Cordele, GA 31015, Estados Unidos; Du Pont de Nemours (France) SAS: 82 rue de Wittelsheim BP9, 68701 Cernay Cedex, Francia. Gowan Milling, 12300 E. County 8th Street, Yuma, AZ 85365, Estados Unidos

**Importador:** Gowan Chile S.p.A - Riñihue 2450 - B25 - B26, Los Pinos, Reñaca, Viña del Mar, Chile.

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR  
EL PRODUCTO**

**Contenido Neto: 1 Litro**

**INSTRUCCIONES DE USO:****CARACTERÍSTICAS Y FORMA DE ACCIÓN DEL PRODUCTO:**

**Quintec®** es un fungicida de acción preventiva, se fija rápidamente en las ceras de la cutícula, lluvias ocurridas 1 hora después de la aplicación no afectan su eficacia **Quintec®** se libera lentamente y es reabsorbido por el follaje y frutos adyacentes. Impide la infección del oídio interfiriendo en las señales iniciales de infestación, este modo de acción no es compartido por otros fungicidas y no existen resistencias cruzadas entre **Quintec®** y otros grupos químicos. Debido a sus características no hay residuos en el vino.

**Quintec®** es lo suficientemente flexible para entregar un mayor o menor período de protección en función de la dosis empleada.

**Cuadro de Instrucciones de Uso:**

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/hL)	Observaciones
Vid	Oídio	7 - 10	Intervalos cortos de protección: Aplique <b>Quintec®</b> cada 7 a 14 días en función de la presión de oídio existente. Use 9-10 mL/hL y los menores intervalos de aplicación en condiciones de alta presión. En situaciones de menor presión use dosis entre 7-8 mL/hL. Adecuar mojamiento a la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación. Con equipos de bajo volumen no aplique menos de 70 mL/ha en el caso de vid vinífera ni menos de 105 mL/ha en uva de mesa. Máximo 4 aplicaciones por temporada preferentemente en bloques de dos aplicaciones consecutivas.
		14- 20	<b>Intervalos largos de protección:</b> Aplicar cada 14 a 21 días en función de la presión de oídio existente. Use las dosis máximas (18-20 mL/hL) y los menores intervalos de aplicación en condiciones de alta presión de oídio En situaciones de menor presión use dosis de 14-16 mL/hL. Adecuar mojamiento a la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación. Con equipos de bajo volumen no aplique menos de 150 mL/ha en el caso de vid vinífera ni menos de 220 mL/ha en uva de mesa. Máximo 4 aplicaciones por temporada preferentemente en bloques de dos aplicaciones consecutivas.
FRUTALES DE CAROZO (Duraznos, nectarines, damascos, pluots, plumcots)	Oídio ( <i>Sphaeroteca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	10	Aplicar entre floración y 50% del tamaño final de los frutos, con volumen de agua de 1.500 l/ha. Una a tres aplicaciones por temporada.

**PERIODO DE CARENCIA (días):** Vid: 14 días; Duraznos, Nectarinos, Damascos, Pluots, Plumcots: 7 días. Esta carencia corresponde a las exigencias del mercado local. Para cultivos de exportación, atenerse a las regulaciones del país de destino.

**OBSERVACIONES:** Se recomienda iniciar su programa de control de oídio con Rally®, Systhane® o azufre y continuar con **Quintec®**.

**PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN:** Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **Quintec®** necesaria y agitando complete el volumen de agua necesario.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con productos que contengan boro ni con aquellos de fuerte reacción alcalina.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso corriente. Puede mezclarse con las aplicaciones de ácido giberélico dirigidas al racimo.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas ó animales al área tratada.

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a fungicidas, esto puede ocurrir a **Quintec®** como a otros fungicidas de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal (mutación) en cualquier población a controlar. En estos casos el uso repetido de un mismo grupo químico puede llevar a estos biotipos de individuos a ser dominantes por lo que la enfermedad será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **Quintec®**, por lo que el importador no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a su falta de control. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Se garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

Noviembre 2022



## CUIDADO

