

27 cm.

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

Helvetica; Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8 a 19

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Triadimefon, ingrediente activo de **SWIFT® T-25**, pertenece al grupo químico de los triazoles. Se debe evitar su inhalación, proyecciones en los ojos, contaminación de los alimentos o su ingestión. Durante su preparación use guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, máscara con filtro y antiparras. Durante la aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar guantes impermeables, botas de goma, traje protector impermeable, máscara con filtro y antiparras. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación. Después de la pulverización, lavar con abundante agua las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad pertinente.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: **Ingestión:** puede provocar malestar estomacal y espasmos musculares; **Inhalación:** posibles mareos, dolor de cabeza, congestión pulmonar, puede irritar las vías respiratorias; **Contacto dérmico:** dermatitis leve; **Contacto ocular:** posible irritación.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Lavado gástrico con suero salino, administrar absorbente, 5 g. carbón activado suspendido en una solución de 10 a 30 g. de sulfato de sodio en 500 cc. de agua usado como laxante. No suministrar sustancias que favorezcan la absorción, como leche, grasa y alcohol. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de **Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Antídoto: No existe antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base.

ECOTOXICIDAD: **SWIFT® T-25** es ligeramente tóxico para peces, virtualmente no tóxico para abejas y prácticamente no tóxico a las aves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

SWIFT® T-25

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Lote N°:

Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero N° 2.289

SWIFT® T-25 es un fungicida sistémico para el control de hongos (Oídio, Roya y Septoria), inhibidor de esteroides con acción preventiva y curativa en Frutales, Vides, Cereales, Chacras y Hortalizas, descritos en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Triadimefon*	25 % p/p (250 g/kg)	%p/p
Coformu antes, c.s.p.	100 % p/p (1 kg)	
* 1-(4-c orofenol)-3,3-d met -1-(1H-1,2,4-triazolo -1-Il) butan- 2-ona		

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: 1 Kg.

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

Fabricado por:

Sundat (S) Pte. Ltd.
26 Gul Crescent 629532
Singapur

Laoting Yolo Bio-Technology Co. Ltd.
No. A-3, Tianjin Road,
Laoting Economic Development Zone,
Hebei Province, 063600,
China.

Distribuido por:



Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL
El Rosal 4610, Huechurabá, Santiago
ET2289-V011-OS2
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
<https://www.upl-td.com/cl>

INSTRUCCIONES DE USO

SWIFT® T-25 es un fungicida sistémico para el control de hongos (Oídio, Roya y Septoria), inhibidor de esteroides con acción preventiva y curativa en Frutales, Vides, Cereales, Chacras y Hortalizas, descritos en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzanos, Peral	Oídio	20-30 g/100 L de agua	Aplique al observar los primeros síntomas. Aplicar entre Botón Rosado y Caída de Pétalos. Repetir cada 7 a 10 días de acuerdo a la presión de la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada.
Víñas y Parronales	Oídio	20-30 g/100 L de agua ó 300-400 g/ha	Aplique al observar los primeros síntomas. Aplique en brotes de 30 cm. hasta inicio de pinta, repitiendo cada 7 a 10 días de acuerdo a la presión de la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada.
Cucurbitáceas: Melones, Pepinos, Sandías, Zapallos	Oídio y Roya	300 g/ha	Aplique al observar los primeros síntomas. Repita de acuerdo a la presión de la enfermedad cada 5 días. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada.
Cereales: Trigo, Cebada, Avena, Centeno.	Oídio y Roya Septoriosis, Rincosporiosis, Helminthosporiosis*	300-500 g/ha	Aplique al observar los primeros síntomas. En caso de declarada la enfermedad aplicar la dosis mayor. Repetir a los 7 - 10 días. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada.
Alcachofas, Habas, Papas, Pimientos, Tomates, Espárragos.	Oídio y Roya	300 g/ha	Aplicar al observar los primeros síntomas. Repetir a los 7 - 10 días. No aplicar más de 2 veces en la temporada.
Remolacha	Oídio	500 g/ha	Aplicar al observar los primeros síntomas. No aplicar más de 1 vez en la temporada.
Leguminosas: Porotos, Lentejas, Arvejas, Garbanzos	Oídio y Roya	500 g/ha	Aplicar cuando comiencen a aparecer las primeras pustulas sobre el follaje. Repetir a los 7 días. Aplicar 1 vez en la temporada.
Lúcumas, Mangos, Papayos, Kiwis	Oídio	20-25 g/100 L de agua	Aplicar preventivamente en caída de pétalos, repetir a los 10 días. Realizar máximo 2 aplicaciones durante la temporada.
Frutillas	Oídio	500 g/ha ó 50 g/100 L de agua	Aplicar preventivamente o cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas. Repetir a los 7 - 10 días. Realizar máximo 2 aplicaciones durante la temporada.
Frambueso	Oídio, Roya, Septoria	50 g/100 L de agua	Aplicar preventivamente desde floración o cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas. Repetir a los 7 - 10 días. Realizar máximo 2 aplicaciones durante la temporada.
Viveros forestales	Oídio	50 g/100 L de agua	Aplicar al observar los primeros síntomas. Aplicar 2 veces en la temporada con intervalos de 7 - 10 días.
Flores: Clavel, Crisantemo, Rosal	Oídio y Roya	50 - 100 g/100 L de agua	Aplicar al observar los primeros síntomas. Aplicar 2 veces en la temporada con intervalos de 7 - 10 días.

NOTA 1: Por tratarse de un fungicida sistémico no recomendamos su aplicación en espolvoreo, ya que requiere agua para su absorción. Emplear dentro de un programa de manejo antiresistencia, alternando con productos de diferentes modos de acción.

(1) Para el caso de Septoriosis, Rincosporiosis, Helminthosporiosis en cereales, aplicar a inicios de síntomas. Realizar una segunda aplicación con intervalo de 7-15 días. Máximo 2 aplicaciones por temporada.

Utilizar los siguientes rangos de mojamientos en cada cultivo: Frutales, Pomáceas: 1500 L agua/ha; Víñas y Parronales: 1000 - 2000 L agua/ha; Cucurbitáceas, Cereales, Leguminosas, Hortalizas: 400 - 600 L agua/ha; Alcachofas, Papas: 400 - 600 L agua/ha; Remolacha: 200 L agua/ha; Frutillas, Frambuesas, Viveros forestales: 1000 L agua/ha; Flores: 500 - 1000 L agua/ha.

APLICACIÓN

Preparación de la mezcla: Mezclar la dosis del producto con agua hasta lograr una suspensión homogénea y luego vaciarla al estanque del equipo pulverizador.

INCOMPATIBILIDAD: **SWIFT® T-25** No realizar aplicaciones en conjunto o consecutivas con productos de reacción alcalina, ácidos u óxidos fuertes. En caso de dudas se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD: **SWIFT® T-25** es compatible con la mayoría de los pesticidas orgánicos en formulación polvo mojable y suspensión acuosa. Evitar otras formulaciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado según las instrucciones de uso de la etiqueta. En perales, durazneros y nectarines se recomienda aplicar con temperaturas inferiores a 25°C, considerando que algunas variedades son delicadas. Siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta el producto no es fitotóxico.

PERIODO DE CARENCIAS (DÍAS): Uvas: 14; Manzana, Papas, Tomates, Pimientos, Espárragos, Alcachofas: 15; Peral: 7; Porotos, Lentejas, Arvejas, Garbanzo, Habas: 21; Melones, Pepinos, Sandías, Zapallos: 3; Cereales (Trigo y Cebada, Avena y Centeno): 35; Frutillas, Frambuesa: 7; Mangos, Lúcumas, Papayos, Kiwis: 15; Remolacha: 15; Flores y Viveros Forestales: No corresponde establecer carencias por no ser un cultivo alimenticio. Para cultivos de exportación atencese a las exigencias del país de destino.

TIEMPO DE REINGRESO: Como resguardo para el reingreso para personas y animales no reingresar al área tratada hasta pasadas 12 horas después de la aplicación.

NOTA 2: Acción curativa: Entiéndase por curativo la inhibición del desarrollo del hongo antes de producirse la infección (Pre síntoma) y no posterior a ella.

©SWIFT es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.

18 cm.



CUIDADO



2,7 cm.

■ PANTONE 347 C

■ PANTONE NEGRO 100%