

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**Grupo Químico:** Pendimetalina pertenece al grupo químico de las dinitroanilinas.

**TERWEED®** es un herbicida residual o suelo activo de baja volatilidad y que se considera moderadamente peligroso para los humanos y animales.

**Precauciones de uso:** dañino si es ingerido. Evitar el contacto con la piel, ojos, ropa y la inhalación de la deriva en la aplicación. No beber, fumar y comer durante la manipulación y aplicación del producto.

**Equipo de protección personal:** durante la manipulación usar delantal impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. Durante la aplicación usar de protección, traje impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes de goma. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua. No aplicar de un modo directo o por deriva a trabajadores expuestos u otras personas.

No contaminar alimentos, pastos, fuentes ni cursos de agua. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

A la dosis de aplicación recomendada, **TERWEED®** no es dañino al medio ambiente, moderadamente tóxico para los peces, prácticamente no tóxico para aves y ligeramente tóxico para abejas.

**Instrucciones para el triple lavado:** Realizar triple lavado de los envases, agregando agua al recipiente hasta un cuarto de su volumen, agitar bien y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Los envases deben perforarse para así evitar su reutilización.

**Síntomas de Intoxicación:** Dolores de cabeza, dolores estomacales e indigestión.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**Primeros auxilios:** **En caso de inhalación:** mover al aire fresco. Si no respira y tiene morado los labios y las uñas, realizar prácticas de resucitación estándar. Dar una respiración boca a boca, cada 4 segundos (15 respiraciones por minuto). Llamar a un médico.

**En caso de ingestión:** tomar 1 a 2 vasos de agua, inducir al vómito, sólo por personal capacitado, solicitar atención médica. No inducir el vómito si la persona está inconsciente. La persona intoxicada no debe tomar aceite, leche o huevo.

**En caso de contacto ocular:** Lave inmediatamente los ojos con agua limpia, durante 15 minutos, y cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. **En caso de contacto cutáneo:** lavar con agua de la llave, remover las ropas contaminadas, llamar por atención médica. No permita que la persona intoxicada fume o ingiera bebidas alcohólicas.

**Tratamiento médico de emergencia:** ABC de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico protegiendo las vías respiratorias, seguido de administración de carbón activado. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.**

**EN FLORACIÓN RETIRAR LAS COLMENAS DURANTE LA APLICACIÓN.**

**NO APLICAR EN FLORACIÓN, LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS.**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio Santiago, Chile, CITUC/AFIPA, o RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500.

©TERWEED es Marca Registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.

# TERWEED®

## HERBICIDA Concentrado Emulsionable (EC)

Lote N°:

Fecha Venc.:

Autorización del Servicio  
Agrícola y Ganadero N° 3.620

**TERWEED®** es un herbicida residual o suelo activo de baja volatilidad, actuando al ser absorbido por las raíces y puntos de activo crecimiento de las malezas en germinación, inhibiendo la emergencia de malezas anuales gramíneas y también numerosas malezas de hoja ancha especificadas en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

**COMPOSICIÓN:**

Pendimetalina(\*)..... 33.0% p/v (330 g/L)

Cofomulantes c.s.p. .... 100.0% p/v (1L)

(\*) N-(1-etilpropil)- 2,6 dinitro- 3,4 xilidina

% p/v

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**

**AGROSPEC S.A.**  
Camino El Milagro 257  
Maipú, Santiago, Chile

**MEGHMANI INDUSTRIES LTD.**  
Block N° 401, Village: Chharodi, Ta: Sanand,  
Dist.: Ahmadabad 382 170, India

**UPL Limited**  
Uniphos House, Madhu park, 11th Road,  
Khar (W), Mumbai- 400 052, India

**Importado y Distribuido por:**



**Arysta LifeScience Chile S.A.**  
una empresa UPL  
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago  
ET3620-V002-0S1  
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501  
<https://www.upl-ltd.com/cl>



**NOCIVO**



**INSTRUCCIONES DE USO**

**TERWEED®** es un herbicida residual o suelo activo de baja volatilidad, actúa inhibiendo la emergencia de malezas anuales gramíneas y también numerosas malezas de hoja ancha.

**Equipo de aplicación:** pulverizador.

**Preparación de la mezcla:** agregar, **TERWEED®** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar el estanque y aplicar. El sistema de agitación, debe funcionar durante toda la aplicación. Si se utiliza, **TERWEED®** en mezcla con otros herbicidas, hacer una premezcla en un balde con agua y luego aplicar al estanque a medio llenar.

**Precauciones:** para aplicaciones en plantas producidas en sistema speedling, consultar al departamento Técnico.

**Carencia:** no aplicable, ya que el producto es aplicado al sembrar o trasplantar.

**Fitotoxicidad:** puede ser fitotóxico, si es aplicado en suelos arenosos y es transportado por agua de lluvia o riego hasta la semilla de germinación.

**Compatibilidad:** es compatible con Simazina, Oxiflorfen, Glifosato, Linuron, Paraquat, Metribuzina, Metabenzthiazuron, Prometrina y Aminotriazol. Antes de la aplicación realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

**Incompatibilidad:** es incompatible con productos alcalinos u oxidantes.

**Tiempo de Reingreso al Área Tratada:** 24 horas, para animales no corresponde, dado que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

**Nota del fabricante:** El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

**CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO**

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Vides, Manzanos, Perales, Membrillos, Ciruelos, Durazneros, Nectarinos, Damascos, Cerezos, Almendros, Paltos, Naranjos, Limones, Pomelos, Mandarinos, Tangerinas, Tangelos, Limas, Kiwis, Nogales, Frambuesos, Arándanos, Olivos, Nisperos, Caquis.	<b>Malezas de hoja ancha:</b> Alfilerillo ( <i>Erodium cicutarium</i> ), Bledo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), Bolsita del Pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ), Calabacillo ( <i>Silene gallica</i> ), Cerastio ( <i>Cerastium sp.</i> ), Duraznillo ( <i>Polygonum persicaria</i> ), Hierba de la Culebra ( <i>Fumaria parviflora</i> ), Hierba Mora ( <i>Prunella vulgaris</i> ), Lengua de Gato ( <i>Galium aparine</i> ), Ortiga Muerta ( <i>Lamium amplexicaule</i> ), Pasto Pinito ( <i>Spergula arvensis</i> ), Porotillo ( <i>Fallopia convolvulus</i> ), Quinhuilla ( <i>Chenopodium album</i> ), Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Verónica ( <i>Veronica persica</i> )	4-4,5	<b>TERWEED®</b> se puede aplicar desde el primer año de plantación como tratamiento invernal. Se debe aplicar en preemergencia de las malezas, para ser incorporado por lluvias o riego. Para el control en surcos de riego en primavera-verano, se debe aplicar en surcos de riego, en preemergencia de las malezas, regando posteriormente, para su incorporación. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L /ha de agua. Realizar como máximo dos aplicaciones por temporada con un intervalo de 2 a 3 meses entre ellas.
Alcachofa, Apio, Cebolla, Puerro, Lechuga, Tabaco.			Aplicar en pretransplante e incorporar o melgar, aplicar, regar y transplantar. Emplear la dosis menor en suelos livianos y la mayor en suelos pesados. No transplantar plantas producidas en speedling sobre melgas tratadas en superficie con <b>TERWEED®</b> , preferir la aplicación de pretransplante incorporado. Aplicar una vez durante el cultivo.
Ajo, Papa			Aplicar en preemergencia del cultivo. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L de agua/ha. Aplicar una vez durante el cultivo.
Brócoli, Coliflor, Pimentón, Aji, Radicchio, Repollo, Tomate.			Aplicar en pretransplante e incorporar o melgar, aplicar, regar y transplantar en todos los cultivos, excepto en tomates que sólo se debe aplicar en pretransplante e incorporar. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L/ha de agua. Se puede aplicar una segunda vez durante el cultivo, entrehileras, a los 60 a 90 días después de la primera aplicación, en dosis de 3 - 4 L/ha. No transplantar plantas producidas en speedling sobre melgas tratadas en superficie con <b>TERWEED®</b> , preferir la aplicación de pretransplante incorporado.
Espárragos	<b>Malezas gramíneas:</b> Ballica ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Hualcacho ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Maicillo de semilla ( <i>Sorghum italapense</i> ), Pasto de la Perdiz ( <i>Panicum capillare</i> ), Pata de Gallina ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Pega-Pega ( <i>Setaria verticillata</i> )		Aplicar en preemergencia de los turiones e incorporar con rastraje superficial. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L/ha de agua. Aplicar una vez durante el cultivo.
Eucaliptus			Aplicar sobre la banda de plantación, previo a la plantación. Al momento de la plantación cuidar de no llevar suelo tratado a la zona de las raíces. Aplicar con 200 a 400 L/ha de agua. Aplicar una vez por temporada.
Haba, Frejol, Lupino.		3-4	Aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra. Puede ser incorporado, por lluvias o riego, hasta 14 días después de la aplicación. No aplicar en suelos arenosos o con menos de 2% de materia orgánica. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L/ha de agua. Aplicar una vez durante el cultivo.
Arveja		2,5-3	Aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra. Puede ser incorporado, por lluvias o riego, hasta 14 días después de la aplicación. No aplicar en suelos arenosos o con menos de 2% de materia orgánica. Emplear dosis mayor en suelos pesados y menor en suelos livianos. Aplicar con 200 a 400 L/ha de agua. Aplicar una vez durante el cultivo.
Trigo y Triticale		3	Aplicar en preemergencia del cultivo y de las malezas, debiendo ser incorporado con lluvia. Utilizar en suelos con contenidos de materia orgánica > 7%. Aplicar con un moajamiento menor a 200 L de agua/ha.

"LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, SE DEBEN EVITAR LAS APLICACIONES CON ABEJAS PRESENTES O CON MÍNIMA ACTIVIDAD DE POLINIZADORES".



**NOCIVO**

