

# TANGO® 24 EC

## HERBICIDA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.488

**TANGO® 24 EC**, es un herbicida de contacto, residual y de aplicación en pre y postemergencia de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

#### COMPOSICION:

* Oxifluorfenó .....	24% p/v (240 g/l)
Coformulantes c.s.p .....	100% p/v (1 l)
* 2 - cloro - $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ - trifluoro - p - tolil - 3 - etoxi - 4 - nitrofenil éter.	

#### <<LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
LAMPA – CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC  
CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou  
County, Zhejiang, China ZIP: 324400

#### NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**TANGO® 24 EC**, herbicida cuyo ingrediente activo Oxifluorfenó pertenece al grupo químico de los Difenil éter. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y la aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**TANGO® 24 EC**, es moderadamente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

**Instrucciones de Triple Lavado:** Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta  $\frac{1}{4}$  de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al terminar el triple lavado, los envases deben ser perforados o inutilizados para evitar su reutilización.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Retirar al afectado del área de exposición y llevarlo al aire libre, si no respira dar respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo. **En caso de ingestión:** No administrar agua ni provocar vómitos, debido a un riesgo de complicaciones pulmonares. Trasladar al afectado al servicio hospitalario más cercano, en lo posible llevando la etiqueta o el envase del producto. **En todos los casos** trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

**Síntomas de Intoxicación:** Irritación de la piel y ojos, irritación de las vías respiratorias, cefalea, confusión mental, irritación gastrointestinal, vómitos, diarrea, vértigo, letargo, pasividad y ataxia.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **TANGO® 24 EC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I.



### CUIDADO



## INSTRUCCIONES DE USO

**TANGO® 24 EC**, es un herbicida que controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Cebolla de trasplante	Alfilerillo Arvejilla Ballica Bledo	1 - 1,5	Aplicar de pre-trasplante después de melgar. Aplicar después del trasplante 1,5 L/ha a los 15 días y 1,0 L/ha a los 40 días. Aplicar con malezas de 3-4 cm de altura o 2 hojas verdaderas y volumen de agua 400 L/ha. En post-trasplante <b>Tango® 24 EC</b> 0,3-0,6 L/ha repetidamente.	45
Cebolla siembra directa	Bolsita del pastor Bromo	1 - 1,5	Aplicar de post-emergencia temprana de las malezas sobre suelo húmedo y con plantas de 4 hojas verdaderas. Mojamiento 300-400 L/ha	60
Cebolla picklera y Ajo	Cardo de Canadá Cardo negro Chamico	1 - 1,5	Aplicar en post-emergencia, con suelo húmedo sobre malezas que tengan 1 a 2 hojas verdaderas y cultivo con 2 a 3 hojas como mínimo o con 8 a 10 cm de altura. Repetir con reinfestación de malezas. Mojamiento de 400 L/ha.	60
Brócoli, Repollo, Coliflor, Alcachofa	Enredadera Duraznillo Hualcacho	2 - 3	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas. No aplicar sobre el cultivo después del trasplante. Aplicar sobre suelo bien nivelado, melgado y húmedo 1 a 2 días antes del trasplante. Mojamiento 300-400 L/ha	No corresponde
Lechuga, Espinaca	Lechuguilla Malva Manzanilla	0,5	Aplicar en pre-emergencia de las malezas antes de la siembra o trasplante, con suelo melgado y bien húmedo. No se debe aplicar en post-emergencia del cultivo. Mojamiento 300-400 L/ha	No corresponde
Limonero, Naranja, Pomelo, Mandarino, Clementina, Tangerina, Vifias, Parronales, Kiwi, Manzano, Peral, Palto, Almendro, Avellano europeo, Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Damasco, Nogal, Olivo, Arándano, Frambuesa, Cranberry	Ñilhue Ortiga muerta Pacoyuyo Pata de gallina Poa o Piojillo Pichoga Pimpinela escarlata Quinguilla Quiloy-Quiloy Pasto pinito	2-4	Aplicar en otoño invierno, de abril a agosto, pre o post emergencia temprana de las malezas, sobre suelo mullido y húmedo. Aplicar sólo hasta 15 días antes de brotación. Puede ser usado desde el primer año de plantación tomando la precaución de no aplicar más de 2 L/ha y no mojar los troncos poco lignificados durante los dos primeros años. No aplicar en suelos arenosos. En vides aplicar post-plantación de estacas enraizadas, manteniendo un periodo entre la aplicación y la brotación de al menos 15 días, utilizando un máximo de 2 L/ha. No aplicar si existen yemas en inicio de brotación o tejido verde. En caso de plantación en bolsa, aplicar en dosis máxima de 2 L/ha, 3 días antes de plantar para evitar fitotoxicidad.	No corresponde
Viveros forestales Pino	Pega-pega Rábano Romaza Sanguinaria Senecio	2	Aplicar en pinos después de la siembra, en preemergencia de las plantas, o bien, en post emergencia después de 5 semanas de emergidas, esto debido a que <b>TANGO® 24 EC</b> es fitotóxico en plantas de Pino recién emergidas. Aplicar en eucaliptus en post-emergencia, con plantas sobre 5 cm de altura.	No corresponde
Eucaliptus	( <i>Senecio vulgaris</i> )	1 - 1,5	Mojamiento de 200 a 400 L/ha.	
Plantaciones forestales de Pino y Eucaliptus	Verdolaga Verónica Yuyo ( <i>Brassica rapa</i> )	3 - 4	Aplicar en invierno en forma dirigida después del trasplante, sobre suelo sin malezas o recién emergidas. En aplicaciones post- emergentes, cuidar de no tocar las plantas del cultivo. Usar dosis medias en el control únicamente de gramíneas, con un mojamiento de 150 a 300 L/ha.	No corresponde

### Observaciones:

- No realizar labores después de la aplicación. Al remover el suelo se destruye la actividad herbicida.
- Lluvias o riegos por aspersión posteriores a una aplicación pueden afectar por salpicado de producto desde el suelo a las partes bajas o tiernas del cultivo o plantas nuevas.
- En cultivos hortícolas establecidos aplicar dirigido a la maleza, procurando no mojar el cultivo.
- No se debe aplicar en cultivos de cebolla de siembra directa o ajo de semilla
- No aplicar para controlar malezas de reproducción vegetativa,
- Generalmente se aplica una vez por temporada de cultivo, sin embargo, es factible repetir el tratamiento cada vez que exista una nueva emergencia de malezas desde el suelo.
- Se aplica por aspersión al suelo para el control pre y post emergente de las malezas, usando agua como carrier.
- Realizar como máximo 15 aplicaciones por temporada
- Usar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo, estado de cotiledón, y dosis mayor con malezas más desarrolladas, primeras hojas verdaderas.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **TANGO® 24 EC**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad:** **TANGO® 24 EC**, es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso corriente como Paraquat, Rango 480 SL, Simazina. En caso de dudas o desconocimiento

respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 24 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

**Clasificación HRAC:** Grupo E inhibidor de la biosíntesis de la enzima PPO (protoporphyrinogen-IX-oxidasa).

Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o cambios en la sensibilidad a herbicidas. Esto puede ocurrir a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas y llegar a afectar a **Tango® 24 EC** como a otros productos de su mismo grupo químico. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de herbicidas y la población será de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **Tango® 24 EC**, por lo que Anasac no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o a algún especialista.



## CUIDADO

