

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA

Fenarimol pertenece al grupo químico de las pirimidinas.

No fume, coma o beba durante el uso de este producto.

Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco, exclusivo para productos fitosanitarios. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables y botas de goma, protector facial y overol impermeable. Durante la aplicación utilizar guantes impermeables y botas de goma, overol impermeable, antiparras y máscara con filtro.

Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar sobre estanques o corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: En ojos, piel y vías respiratorias puede ocasionar irritación. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, lentitud del pulso, convulsiones musculares, salivación y debilidad muscular.

Primeros Auxilios: Inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llamar a un médico. **Contacto con la piel:** Remover la ropa contaminada y lavar bien la piel afectada con agua de la llave. Obtener atención médica si la irritación persiste. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Obtener atención médica si la irritación persiste. **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Obtener atención médica inmediatamente.

Tratamiento médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático basado en juicio del médico en respuesta a las reacciones del paciente.

Antídoto: No posee antídoto específico.

Riesgos ambientales: No tóxico para abejas y aves. Tóxico para peces.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"

"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"

"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Instrucciones para triple lavado: Llenar ¼ del envase con agua y agitar en todos los sentidos, luego vaciar esa agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. Realizar la operación anterior 3 veces. Perforar el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia: NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A.: (2) 24447111 - RITA-CHILE: (2) 26619414 / 27771994

Nota al comprador: El importador garantiza que el producto cumple con la descripción química declarada en esta etiqueta mientras el producto se mantenga en su envase original, debidamente conservado y sellado. Debido a que las condiciones, momentos, método, eventuales resistencias de los organismos a controlar, dosis, limpieza y calidad del equipo aplicador, escapan totalmente a nuestro control, declinamos toda responsabilidad sobre los resultados, intoxicaciones, eventuales daños al cultivo o equipo de aplicación o control insatisfactorio resultante del uso de este producto.

RUBIGAN®

FUNGICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

RUBIGAN® es un fungicida sistémico, cuya acción consiste en inhibir la síntesis del ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos. Es eficaz en el control preventivo y curativo del oidio en vides de mesa y viníferas, manzanos, perales, tomate, papa y cucurbitáceas y Venturia en manzanos y perales.

Composición:

* Fenarimol.....12% p/v (120 g/l)
Coformulantes c.s.p.c.....100% (1L)
* Alcohol (RS)-2,4-dicloro-α-(pirimidin-5-il)benzidrílico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2.235

INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

Lote Nro:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

Fabricado por:
GOWAN MILLING
12300E, County 8th Street
Yuma, AZ 85365
Estados Unidos.

Importado y Distribuido por:
Nutrien Ag Solutions Chile S.A.
Av. Apoquindo 4700 of.502
Las Condes- Santiago
Chile

Nutrien
Ag Solutions

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

RUBIGAN® es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los IBE (Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol). Es eficaz en el control preventivo y curativo del oidio en vides de mesa y viníferas, manzanos, perales, tomate, papa y cucurbitáceas.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/ha)	Observaciones (*)
Viñas y Parronales	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	No superar las dosis máximas recomendadas por ha: Aplicaciones pre-floración: 250 cc/ha. Aplicaciones de floración a cuaja: 400 cc/ha. Aplicaciones post-cuaja: 500 cc/ha. No superar 1500 cc/ha por temporada.	Actividad preventiva y curativa sobre oidio. No usar menos de 200 cc/ha. Comenzar tratamientos con brotes de 40 – 50 cm. de largo. Aplicar la dosis mínima en prefloración, después de esto aumentar la dosis según presión del oidio, dentro del rango sugerido. No realizar más de tres aplicaciones en la temporada (**), repitiendo cada 10-12 días.
Manzanos, Perales	Venturia (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	400 – 600	Tratamiento preventivo: Comenzar las aplicaciones desde puntas verdes en adelante, con intervalos de 7 a 10 días y desde caída de pétalos en adelante a intervalos de 10 a 14 días. No usar menos de 400 cc/ha si se usa sólo. Tratamiento curativo: Controla Venturia hasta 96 horas después de iniciadas las condiciones para que se produzca la infección. Iniciar las aplicaciones en plena flor hasta fruto cuajado con intervalos de 14 días. No realizar más de tres aplicaciones en la temporada. Utilizar la dosis mayor con síntomas visibles de oidio.
Melón, Sandía Zapallo de guarda Zapallo italiano Pepino	Oidio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	250 – 400	Iniciar las aplicaciones preventivas utilizando la dosis mínima. Repetir cada 15 a 21 días, con un máximo de tres aplicaciones por temporada. Utilizar la dosis mayor con síntomas visibles de oidio.
Papa, Tomate	Oidio (<i>Oidium lycopersici</i>) Oidio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	250 – 400	Para el control preventivo utilizar la dosis mínima. Repetir la aplicación con intervalos de 15 a 21 días. Con síntomas de oidio usar la dosis máxima. No efectuar más de tres aplicaciones por temporada.

(*) A pesar de ser un fungicida sistémico, su movimiento dentro de la planta es limitado, por lo que se debe emplear un volumen suficiente de agua para lograr un completo cubrimiento del follaje (1500 – 2000 L/ha en caso de frutales; 200 – 800 L/ha en caso de hortalizas).

(**) Alternar las aplicaciones de Rubigan® con fungicidas de distinto grupo químico y/o modo de acción.

Preparación de la mezcla: Poner agua en el estanque hasta la mitad. Poner en movimiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria del producto y luego completar con agua a volumen total con agitación constante.

Condiciones para una aplicación segura y eficaz: Evite aplicar con temperaturas sobre 27°C, ya que podría producir fitotoxicidad. Aplique Rubigan® con temperaturas moderadas, preferentemente por la tarde cuando la radiación solar no es muy intensa, o por las mañanas en días nublados. Evite aplicar Rubigan® en presencia de lluvia o rocío, para evitar el lavado del producto. Evite aplicar Rubigan® en condiciones de mucho viento, para evitar la deriva del producto.

Incompatibilidad: No mezclar con más de tres productos. No utilizar en conjunto con adyuvantes o aceites.

Compatibilidad: Rubigan® es compatible con azufre y la mayoría de los fungicidas, insecticidas, acaricidas y otros productos normalmente utilizados.

Fitotoxicidad: Rubigan® no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta. No usar durante el periodo inicial de la brotación de la vid, hasta que los brotes tengan al menos 40 a 50 cm de largo. No aplicar con temperaturas elevadas (sobre 27 ° C).

Periodo de Carencia: Parronales y viñas: 14 días; Manzanos: 21 días; Perales: 28 días; Pepino, Melón, Sandía, Zapallo de guarda, Zapallo italiano: 7 días; Tomate: 14 días; Papa: 27 días. **Tiempo de Reingreso:** Personas y animales pueden reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.