

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Valifenalato pertenece al grupo de los carbamatos de valinamida y Clorotalonilo pertenece al grupo químico de los cloronitrilos.
- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No almacenarlo con herbicidas volátiles.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación** usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. **Durante la aplicación** usar guantes impermeables, botas de goma, antiparras, máscara con filtro, traje impermeable.
- Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua.
- Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si persisten molestias acudir a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consultar a un médico.

En caso de ingestión: No inducir vomito. Ver inmediatamente a un médico y presentarle la hoja de seguridad o la etiqueta. No dar nada por la boca ni inducir el vomito si la persona esta inconsciente.

En caso de inhalación: Ventilar el lugar. Remover inmediatamente al paciente del área contaminada y dejarlo en reposo en área bien ventilada. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Obtener atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales: Producto altamente toxico para especies acuáticas. No toxico para aves y abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO

CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O

CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO ANIMAL O HUMANO

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE

AGUA

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE

LA AUTORIDAD COMPETENTE

Teléfonos de emergencia:

CITUC (56-2)26353800 - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

Cheminova Chile Ltda: (56-2) 28204303

Notal al comprador: mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

SIENA STAR

11.04.18

FUNGICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

SIENA STAR es un fungicida de acción sistémica, preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante, recomendado para el control de tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en papa y mildiu (*Peronospora destructor*) en cebolla.

Composición

Valifenalato*	10,0 % p/p (100 g/kg)
Clorotalonilo**	65,0 % p/p (650 g/kg)
Cofomulantes, c.s.p	100 % p/p (1 kg)

(*) *N*-(isopropoxicarbonil)-L-valil-(3*RS*)-3-(4-clorofenil)-β-alaninato de metilo

(**) Tetracloroisoflortalonitrilo.

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2799

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto:

Fabricado por:

ISAGRO S.p.A. Adria
Cavanella Po. Adria
45010 Rovigo, Italia

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.
Via Evangelista Torricelli, 2
48010 Cotignola (Ravenna), Italia.

ISAGRO S.P.A.APRILIA

Vía Nettunense Km. 23.400
0411 Aprilia (Latina). Italia

Importado por:

Cheminova Chile Ltda
Av. Vitacura 2670 of. 1501
Las Condes, Santiago

FMC

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

SIENA STAR es un fungicida que contiene dos ingredientes activos de modo de acción diferente, valifenalato y clorotalonilo, presentando acción sistémica, preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se recomienda para el control de tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en Papa y mildiu (*Peronospora destructor*) cebolla.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Cebolla	Mildiu	1,5 – 2,0 kg/ha	Aplicar la dosis menor antes que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y la mayor cuando ya aparecieron los síntomas. Repetir con una frecuencia de 7 días, realizando máximo 4 aplicaciones por temporada. Pulverización por vía líquida, empleando 400 L/ha de agua.
Papa	Tizón tardío	1,5 - 2,0 kg/ha	Aplicar la dosis menor antes que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y la mayor cuando ya aparecieron los síntomas. Repetir con una frecuencia de 7 días, realizando máximo 3 aplicaciones por temporada. Pulverización por vía líquida, empleando 400 L/ha de agua..

Importante: cubrir uniformemente todo el follaje de los cultivos para lograr un control eficiente de las enfermedades. No realice la aplicación en horas de calor intenso; preferentemente aplique en la mañana cuando las temperaturas sean bajas. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta.

Preparación de la mezcla

Disolver la cantidad necesaria de **SIENA STAR** en un poco de agua. Luego adicionar esta pre mezcla al estanque a medio llenar de agua y completar con agua al volumen requerido manteniendo la agitación constante hasta terminar la aplicación.

Incompatibilidad

Se recomienda mezclar solo con formulaciones de polvos mojables. No mezclar con aceites, polisulfuros y productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad

SIENA STAR no es toxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Periodo de carencia

Cebolla: 7 días; Papa: 7 días.

Reingreso al área tratada

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. No aplicable para animales, pues se recomienda su uso en cultivos y no en especies forrajeras.



CUIDADO



