

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Bromadiolona pertenece al grupo químico de las 4-hidroxycumarinas.
Precauciones de Uso: Durante la preparación del producto utilizar guantes impermeables. Durante la aplicación o establecimiento de cebaderas utilizar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. No comer, beber ni fumar durante el uso del producto. Evitar la ingestión del producto y el contacto con la piel y ojos. No contaminar alimentos, semillas y forrajes. No permitir la entrada de animales domésticos en los sitios en que están siendo colocadas las cebaderas. **Los animales que mueran por efecto de los compuestos utilizados, sean éstos silvestres o domésticos, deberán ser recogidos del lugar por el personal de la empresa aplicadora para ser cremados o enterrados de inmediato y cubiertos con una capa de cal, a una profundidad tal que no puedan ser descubiertos por otros animales. Se debe recoger todo resto del compuesto anticoagulante no consumido, una vez que se hayan efectuado las labores de aplicación.**
Síntoma de Intoxicación: Sangramiento (hemorragias). Llamar a un médico de inmediato y mostrar la etiqueta.

Primeros Auxilios: **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Buscar ayuda médica si se desarrollan síntomas. **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En el caso de persistir la irritación, llamar a un médico. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Sólo si el afectado se encuentra consciente, se le puede dar un poco de agua para el enjuague de su boca. Lavar la boca con agua. Llame a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas inmediatamente. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado a un lugar ventilado. Proporcionar aire fresco y lograr atención médica. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

Antídoto: Vitamina K.

Tratamiento Médico de Emergencia: Este producto está formulado a base de Bromadiolona (Anticoagulante). La vitamina K vía oral o intramuscular en dosis de 2,5 a 10 mg es el antídoto indicado.

Información Ecotoxicológica: Impedir la llegada del producto a la fauna, utilizando protecciones o colocando en forma inaccesible para los animales o aves. No contaminar aguas, es tóxico para peces y aves. No tóxico para abejas.

Teléfonos de Emergencia:

RITA CHILE: (2) 2777 1994 POINT CHILE S.A.: (2) 2747 1677

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"

"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO"

Precauciones de Almacenaje: Conservar el producto en su envase original, bien tapado, con su etiqueta visible en una bodega fresca, seca, bien ventilada, lejos del fuego, bajo techo y seguro bajo llave. Almacenar separado de alimentos.

Aviso al Consumidor: Se garantiza la óptima calidad del producto y los porcentajes de ingrediente activos señalados en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da ningún tipo de garantía por consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del producto es de responsabilidad absoluta del usuario.

RATADOR AGRO

RODENTICIDA-LAGOMORFICIDA

CEBO EN BLOQUES (BB)

Composición:
Bromadiolona* 0,005% p/p (0,5 mg/bloque)
Coformulantes, c.s.p. 100 % p/p (10 g = 1 bloque)

* 3-[[1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxycumarina

RATADOR AGRO es un rodenticida-lagomorficida de segunda generación que controla en forma eficaz: Ratas, Ratones, Lauchas, Conejos y Liebres. Produce la muerte en los individuos que lo consumen; su muerte se produce a los 6 - 8 días después de ingerido.

INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero SAG N° 1.421

Fabricado por:
Point Internacional Ltd.
Bromley BR1 3QF
Inglaterra.

Importado y Distribuido por:



Point Chile s.a.

Lote N°:

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Avda. Presidente. E. Frei Montalva N° 9950 Of. 10,
Quilicura, Santiago-Chile
Fono: (56 2) 2747 1677
Fax: (56 2) 2747 1677 anexo 106

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

INSTRUCCIONES DE USO:

RATADOR AGRO es un rodenticida-lagomorficida que controla Lauchas, Ratones, Ratas, Conejos y Liebres con una sola dosis de ingestión, siendo aceptado ampliamente por su excelente palatabilidad. Produce la muerte en los individuos que lo consumen; su muerte se produce a los 6 - 8 días después de ingerido.

ÉPOCA EN QUE DEBE HACERSE LA APLICACIÓN: Al detectar la plaga se pueden hacer cebaderas con bloques de **RATADOR AGRO** en los sitios donde los roedores o conejos y liebres frecuentan.

No existen condiciones ambientales determinantes para una aplicación segura, sin embargo se recomienda no instalar las cebaderas cuando existan probabilidades de lluvias mayores a 10 mm, las que pudieran trasladar los cebos lejos de los sitios de tránsito de los roedores, conejos o liebres.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

LUGAR	DOSIS	OBSERVACIONES
Plantaciones forestales, frutales, hortalizas y viveros de flores y plantas ornamentales.	2 a 4 kg/ha fijados al suelo uno o dos bloques cada 1 metro, en el perímetro del lugar a tratar y en acequias. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.	Los bloques preferentemente deberán ser ubicados protegidos del consumo de animales no objetivo, o atándolos al interior de tubos. Los cebos se deberán reponer cada 15 días hasta que cese el consumo.

Nota: La aplicación de plaguicidas destinados al control de lagomorfos y roedores, sólo podrá ser realizado por empresas inscritas en el servicio agrícola y ganadero SAG en el Registro Nacional de Empresas Controladoras de Lagomorfos y Roedores.

En caso de minibloques; colocar directo al interior de las madrigueras y en lugares de tránsito de los roedores.

FITOTOXICIDAD: El producto **RATADOR AGRO** no presenta efectos fitotóxicos.

INCOMPATIBILIDAD: El producto **RATADOR AGRO** no presenta incompatibilidad, ya que está recomendado para ser utilizado solo y no en mezcla.

PERÍODO DE CARENCIA: No corresponde fijar carencias dado el modo de aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: El tiempo de ingreso puede ser inmediatamente después de instalados los cebos. No corresponde restringir el ingreso a animales, ya que el producto no es utilizado en cultivos destinados a su alimentación.

ATENCIÓN: Manipular los bloques con guantes impermeables.



CUIDADO

