PANTONE 347 PANTONE BLACK

Lote Nº:
Fecha Vencimiento:

ROUNDUP ULTRAMAX

HERBICIDA
GRANULADO HIDROSOLUBLE
SG

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3493

ROUNDUP ULTRAMAX® es un herbicida sistémico, no selectivo, para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en frutales (durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos, quindos, damascos, almendros, vides (viñas, uva de mesa y parronales), manzanos, kiwis, perales, membrillos, olivos, paltos, lúcumos, chirimoyos, mangos, piñas, nogales, pistachos, pecanos, clementinos, limoneros, naranjos, pomelos, tangelos, mandarinos y avellano europeo). Frutales menores (moras, zarzaparrilla, arándanos, frambuesos, frutillas, cranberries y groselleros). Plantaciones forestales (pino insigne, pino ponderosa, pino oregon, eucaliptus nitens, eucaliptus grandis, eucaliptus globulus, araucaria, cohiue, mañío y lingue). Cero y mínima labranza en canola (raps), cebada, avena, centeno, trigo, triticale, maíz (grano, dulce y silo), maravilla y soya, y praderas como alfalfa, tréboles (anuales y bianuales), ballica (anual, bianual y perenne), festuca y falaris y mezcla de ellas; en barbechos químicos previo al establecimiento de todos los cultivos comerciales. Regeneración de praderas establecidas y naturalizadas.

COMPOSICION:
Glifosato-monoamonio.....74,7% p/p (747 g/kg)
Coformulantes .....100% p/v (1 Kg)

* Carboximetilaminometilfosfonato de monoamonio (equivalente a 67,9 % p/p (679 g/Kg) de glifosato).

Importa y Distribuye:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 15 Kg

Fabricado por:
MONSANTO
MONSANTO ARGENTINA S.R.L.
Maipú 1210 -10º Piso
(C1006ACT) Capital Federal
Buenos Aires, Argentina

Roundup Ultramax y Monsanto son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

ROUNDUP ULTRAMAX® es un herbicida sistémico, no selectivo, para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha (Ver Cuadro de Instrucciones de Uso). La dosis dependerá de las malezas a controlar. En el caso de malezas anuales usando una dosis entre 0,8 y 1,6 kg por hectárea y para malezas perennes entre 1,1 y 4 kg/ por hectárea. Si se deben controlar malezas arbustivas la dosis a aplicar de **ROUNDUP ULTRAMAX** podrá ajustarse entre 3 y 5 kg por hectárea. Cuando se quiere realizar el control de tocones aplicar en dosis de 5-7% hasta 24 hrs después de haber realizado el corte y con la precaución de dejar bien cubierto el cambium.
Frecuencia máxima de aplicación cada 3 semanas durante la época de cultivo. Número máximo de aplicaciones por período productivo: 6.

Cuadro de instrucciones de uso para aplicación terrestre:

Cultivos	Malezas controladas	Dosis de Aplicación (kg/ha)	Frecuencia y número máximo de aplicaciones	Observaciones generales	Condiciones de Aplicación
Frutales: durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos, quindos, damascos, almendros, vides (viñas, uva de mesa y parronales), manzanos, kiwis, perales, membrillos, olivos, paltos, lúcumos, chirimoyos, mangos, piñas, nogales, pistachos, pecanos, clementinos, limoneros, naranjos, pomelos, tangelos, avellano europeo y frutales menores: moras, zarzaparrilla, arándanos, frambuesos, frutillas, cranberries y groselleros.	**Malezas Anuales** Bálicas (*Lolium* sp), Pasto Perro (*Bromus* sp.), Pega-Pega (*Galianta* sp.), Cola de Zorro (*Cynosurus echinatus*) Avenilla (*Avena fatua*), Manzanilla (*Matricaria, Anthemis* sp.), Pata de Pollo (*Poligonum aviculare*), Mostacillas (*Sisimbrium, Rapistrum*)	1,1 - 1,6	Control post-emergente Frecuencia máxima de aplicación cada 3 semanas durante la época de cultivo. Número máximo de aplicaciones por período productivo: 6. Después de una aplicación de ROUNDUP ULTRAMAX®, y antes de dañar mecánicamente (arar, rastrear) las malezas tratadas, espere 3-5 días para asegurar la completa traslocación. Repetir cuando sea necesario según el desarrollo de las malezas.	Del rango de dosis, utilizar la mayor en el caso de alta presión de malezas, activo crecimiento y condiciones predispuestos del ambiente para su desarrollo. La dosis menor se debe aplicar cuando es baja la presencia y tasa de crecimiento de malezas. Evitar aplicaciones sobre malezas cubiertas por tierra, o cuando se prevén lluvias dentro de las 4 - 8 hs posteriores a la aplicación. Para obtener mejores resultados, la concentración del producto en agua no debe ser menor al 1%. Bajo ciertas condiciones naturales existe la posibilidad de ocurrencia de variaciones genéticas que generan biotipos resistentes a herbicidas, lo que puede ocurrir con cualquier producto incluyendo el herbicida ROUNDUP ULTRAMAX®. Estos biotipos resistentes pueden llegar a propagarse y dominar en la zona. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación del herbicida ROUNDUP ULTRAMAX®, por lo que Monsanto Chile S.A. no puede garantizar resultados futuros ni asumir pérdidas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomiendan prácticas culturales, de rotación, prevenir los escapes e impedir que estos semillen, y en particular usar herbicidas de diferentemodo de acción ya sea solo como en combinación con glifosato. Glifosato, de acuerdo a la clasificación HRAC pertenece al grupo G.	Las aplicaciones se pueden realizar con equipos pulverizadores de mochila y terrestres. Debe ser idealmente de 80 a 120 L/ha y no superior a 150 L/ha.
	Hualcacho (*Echinochloa crusgalli*)	1,6			
	Pata de Gallina (*Digitaria sanguinalis*)	0,8 - 1,3			
	Enredadera (*Bilderdyckia convolvulus*)	1,1 - 1,4			
	Bledo (*Amaranthus* sp.), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Ñilanto (*Raphanus sativus*), Quingulla (*Chenopodium* sp.).	1,1			
	Malezas Perennes Pasto Quila (*Agrostis* sp.), Pasto Cebolla (*Arrhenatherum elatius*)	1,1 - 1,6			
	Maicillo (*Sorghum halepense*), Falso Tiá (*Bidens aurea*), Siete Venas (*Plantago lanceolata*)	1,6 - 2,2			
	Galega (*Galega officinalis*), Junquillo (*Juncus* sp.), Carrizo (*Phragmites communis*)	2,2 - 3,2			
	Chépica Gigante (*Paspalum dilatatum*), Chepica (*Paspalum paspalodes*)	2,2			
	Chufa (*Cyperus* sp.)	2,7 - 3,2			
	Chépica o Pasto Bermuda (*Cynodon dactylon*)	3,2			
	Correhuela (*Convolvulus arvensis*)	3 - 4			
	Malezas Arbustivas Ulex (*Ulex europaeus*), Zarzamora (*Rubus* sp.), Maqui (*Aristotelia chilensis*), Bachario(*Baccharis* sp.), Maqui (*Sphyros macrocarpa*), Boldo (*Peumus boldus*), Litre (*Litrea caustica*), Notro (*Kethrolepis oblicua*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Fuinque (*Lomatia ferruginea*), Palqui (*Cestrum parqui*). Ilwa o Peill (*Rusa atomitodes*) Romerillo (*Baccharis* sp.)	3 - 5			
	Control de Tocones	Aplicar en dosis de 5-7% hasta 24h después de haber realizado el corte y con la precaución de dejar bien cubierto el cambium.			

PREPARACION DE LA MEZCLA: Disolver la dosis requerida de **ROUNDUP ULTRAMAX®** en agua limpia del tanque de la aplicadora, con el agitador en marcha, luego complete el llenado con agua. Su formulación contiene un tensoactivo, por lo que sólo se recomienda agregar surfactante no iónico cuando se aplique en aguas duras o sobre malezas difíciles de mojar.
INCOMPATIBILIDAD: No aplicar o almacenar en estanques de acero galvanizado o sin capa protectora (excepto acero inoxidable).
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común, pero si existen dudas hacer pruebas de compatibilidad. Consultar siempre con un representante técnico de la empresa.
FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico sobre cualquier tejido verde que tome contacto con el producto.
PERIODO DE CARENCIA: no tiene carencia con la excepción de 1 día para Manzanos, Peras, Naranjas, Limones, Mandarinas; 3 días para Almendras, Nueces; 6 días para Olivos, 7 días para Durazmos, Nectarinos, Ciruelos y Damascos; 14 días para Vides, Cerezas, Quindas, Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Paltos, Kiwis, Chirimoyos y Mangos.
TIEMPO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada con **ROUNDUP ULTRAMAX®** a las 4 horas después de la aplicación (personas y animales).

Cód. 10699736 Rev.: 6

CUIDADO

Lote Nº:
Fecha Vencimiento:

ROUNDUP ULTRAMAX

HERBICIDA
GRANULADO HIDROSOLUBLE
SG

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3493

ROUNDUP ULTRAMAX® es un herbicida sistémico, no selectivo, para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en frutales (durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos, quindos, damascos, almendros, vides (viñas, uva de mesa y parronales), manzanos, kiwis, perales, membrillos, olivos, paltos, lúcumos, chirimoyos, mangos, piñas, nogales, pistachos, pecanos, clementinos, limoneros, naranjos, pomelos, tangelos, mandarinos y avellano europeo). Frutales menores (moras, zarzaparrilla, arándanos, frambuesos, frutillas, cranberries y groselleros). Plantaciones forestales (pino insigne, pino ponderosa, pino oregon, eucaliptus nitens, eucaliptus grandis, eucaliptus globulus, araucaria, cohiue, mañío y lingue). Cero y mínima labranza en canola (raps), cebada, avena, centeno, trigo, triticale, maíz (grano, dulce y silo), maravilla y soya, y praderas como alfalfa, tréboles (anuales y bianuales), ballica (anual, bianual y perenne), festuca y falaris y mezcla de ellas; en barbechos químicos previo al establecimiento de todos los cultivos comerciales. Regeneración de praderas establecidas y naturalizadas.

COMPOSICION:
Glifosato-monoamonio.....74,7% p/p (747 g/kg)
Coformulantes .....100% p/v (1 Kg)

* Carboximetilaminometilfosfonato de monoamonio (equivalente a 67,9 % p/p (679 g/Kg) de glifosato).

Importa y Distribuye:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 15 Kg

Fabricado por:
MONSANTO
MONSANTO ARGENTINA S.R.L.
Maipú 1210 -10º Piso
(C1006ACT) Capital Federal
Buenos Aires, Argentina

Roundup Ultramax y Monsanto son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
ROUNDUP ULTRAMAX® es un herbicida sistémico, no selectivo. El ingrediente activo (Glifosato-monoamonio) pertenece al grupo químico de los órganofosfonatos. Se debe evitar su inhalación, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de alimentos y agua. Durante la preparación de la mezcla usar protector facial, guantes impermeables, botas de goma y delantal impermeable. Durante la aplicación usar equipo de protección adecuado, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes impermeables, botas de goma y delantal impermeable.

No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución asperjada. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación, lavar cuidadosamente con abundante agua las partes del cuerpo que puedan haber tenido contacto con el producto. **ROUNDUP ULTRAMAX®** debe almacenarse en su envase original bien sellado, en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo a la ley vigente. El producto y su envase de cartón son biodegradables a compuestos inocuos.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación pueden ser: Cefalea, somnolencia, vértigo, irritación, disnea, náuseas y vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS: Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial".
En caso de Contacto con la piel: Lavar con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.
En caso de Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista".
En caso de Inhalación: Trasladé al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial

Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento Médico de Emergencia: aplicar tratamiento base.
ECOTOXICIDAD: No es tóxico para abejas, aves o peces

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**
- **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**
- **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**
- **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

En caso de intoxicación llamar al teléfono: (2) 2635 3800, Santiago, del Centro de Informaciones Toxicológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, atención las 24 horas, convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es: (2) 2560 4500, Santiago, Chile.

ADVERTENCIA LEGAL / NOTA AL COMPRADOR: Monsanto Argentina S.R.L. y Monsanto Chile S.A. garantizan que la composición de este producto está de acuerdo con lo indicado en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento, siempre que el producto sea mantenido en las condiciones de guarda y conservación indicadas en esta etiqueta. Dado que la correcta aplicación de este producto está fuera del control de Monsanto Argentina S.R.L. y/o de Monsanto Chile S.A., éstas no se responsabilizan expresa ni implícitamente por los resultados y/o daños y/o perjuicios, mediatos o inmediatos, que pudieran derivarse del uso distinto al indicado en la etiqueta y/o de la aplicación del producto en violación de la normativa aplicable. Bajo ciertas condiciones pueden surgir biotipos de una maleza que sean resistentes al glifosato u otros grupos de herbicidas. Los biotipos resistentes pueden tornarse dominantes en un lote cuando se refiera un uso inadecuado de dichos grupos de herbicidas. Atento que la existencia de biotipos resistentes y la falta de efectividad del producto en estos casos resulta difícil de detectar antes de la aplicación del herbicida, Monsanto Argentina S.R.L. y Monsanto Chile S.A. no se responsabilizan por ninguna pérdida y/o daño y/o perjuicio, mediato o inmediato, que pudiera resultar de la falta de control por este producto de aquellos biotipos de malezas que hubieran desarrollado una resistencia natural al glifosato.

CUIDADO