

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: Triflusalufuron – metilo pertenece al grupo químico de las sulfonilureas.

Precauciones: Para evitar daños a las personas: No coma, beba o fume durante el uso de este producto, posterior a él lávese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Evite respirar la llovizna de la aspersión. Al preparar la mezcla directamente en el campo, realicela con tiempo calmo y sin viento. Evite el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Al manipular este producto use equipo de protección adecuado: botas de goma, mascarilla para polvos, guantes impermeables y delantal impermeable. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse con abundante agua. Luego de haber usado este producto normalmente, lávese con abundante agua y jabón. Al aplicar este producto use equipo de protección adecuado: botas de goma, guantes impermeable, y traje aplicador u overol impermeable. El equipo a utilizar deberá estar limpio y en buen estado antes de iniciar la aplicación.

Primeros auxilios: Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras.

En contacto con los ojos, lavar con abundante agua de la llave por 15 a 20 minutos, si el afectado utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de inhalación, no se indica tratamiento específico pues no es riesgoso. En todo caso siempre consulte a un médico.

En caso de ingestión, no se indica tratamiento específico pues no es riesgoso. En todo caso siempre consulte a un médico. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial

En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Levemente irritante dermal. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Consulte a un médico.

Tratamiento Médico de Emergencia: se recomienda tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe

Precauciones para la protección del medio ambiente: no aplicar, limpiar o vaciar el equipo cerca de árboles o plantas que no se desee eliminar o en áreas hasta donde puedan extenderse las raíces de aquellas plantas, o en lugares donde el producto pueda ser lavado o arrastrado hacia estas áreas. Prevenir la deriva hacia áreas con plantas susceptibles o en suelos donde se sembrarán cultivos sensibles. No aplicar con vientos mayores a 15 km/ hr.

No contaminar ninguna fuente de agua, incluyendo las aguas de riego, que puedan ser usadas en otros cultivos. Obsérvese cuidadosamente las instrucciones de limpieza de los equipos de aplicación. Este producto posee una baja toxicidad a abejas, insectos benéficos, aves y peces. **Almacenamiento del producto:** Mantener fuera del alcance de los niños. En un lugar bajo llave.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de emergencia: CITUC, Convenio CITUC/AFIPA (2) 2353800. FMC Química Chile Ltda (2) 28204200

FMC garantiza que este producto concuerda con la descripción química de la etiqueta y se ajusta razonablemente a los propósitos establecidos en la misma, solamente cuando se emplea de acuerdo con las indicaciones bajo condiciones de uso normales. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Daños a cultivos, no efectividad u otras consecuencias no intencionales pueden ocurrir debido a factores tales como: condiciones climáticas, presencia de otros materiales o manera de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de FMC. En ningún caso FMC será responsable por daños consiguientes, especiales o indirectos que resulten del mal uso o manejo de este producto. Tales riesgos serán asumidos por el comprador. FMC no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, excepto por lo dicho anteriormente.

® Marca Registrada de E.I. Du Pont de Nemours & Co.

SAFARI[®] 50 DF

HERBICIDA GRANULADO DISPERSABLE WG

Lote N° y fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento: ver envase

**Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero N° 3348**

Bolsas Hidrosolubles

SAFARI[®] 50 DF, es un herbicida Selectivo, con acción sistémica para el control de malezas de hoja ancha en Remolacha Azucarera y Achicoria Industrial (ver instrucciones de uso).

COMPOSICIÓN:

*Triflusalufurón metilo.....	50 % p/p (500 g/Kg)
Coformulantes, c.s.p.....	100 % p/p (1 Kg)
*2-[4-dimetilamino-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]- <i>m</i> -toluato de metilo	

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Contenido Neto: 40 g

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Importado por:
FMC Química Chile Ltda.
Avda. Vitacura 2670, Piso 15,
Las Condes, Santiago, Chile

Fabricado por:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
137, rue de l'Université-F 75334 Paris Cedex
Francia.
Chemnova Agro France SAS
Usine d'Uffholtz, 23 rue de la scierie,
68700 Uffholtz, Francia



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades:

SAFARI® 50 DF, es un herbicida recomendado para el control selectivo post emergente de malezas de hoja ancha (ver cuadro de instrucciones de uso) en remolacha azucarera y achicoria industrial, actúa inhibiendo la formación de la enzima acetolactato sintetasa.

SAFARI® 50 DF no debe ser aplicado sobre un cultivo creciendo bajo condiciones de estrés, ya sea por clima severo, baja fertilidad, sequías, enfermedades o daños de insectos, pues esto podría afectar al cultivo y disminuir el grado de control de estas malezas.

El efecto sobre las malezas aparecerá al cabo de algunos días, dependiendo del desarrollo de estas y de las condiciones para el crecimiento de ellas, mostrándose primero una detención del crecimiento, cambios en la coloración, clorosis, enrojecimiento del tejido y necrosis final.

SAFARI® 50 DF debe ser usado en post emergencia temprana de la maleza sensible, los mejores resultados siempre se obtendrán cuando se aplique sobre malezas más pequeñas, desde puntas verdes hasta su primer par de hojas. **SAFARI® 50 DF** no tiene efecto residual, por lo que se recomienda repetir una segunda o tercera aplicación a los 7 a 10 días después de la aplicación anterior, o cuando las nuevas malezas sensibles estén emergiendo nuevamente y tengan el desarrollo recomendado.

SAFARI® 50 DF, al ser aplicado será absorbido rápidamente a través del follaje de las malezas sensibles, deteniendo el crecimiento y la competencia de estas malezas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS gr/ha	OBSERVACIONES
Remolacha Azucarera	Altamisa, Bledo, Yuyo, Rábano, Pichoga, Hierba de la culbra, Malva, Manzanilla, Hualputra, Duraznillo, Vinagrillo, Ortiga, Verónica, Viola, Amapola roja, Malvilla, Verdolaga.	40 - 50	Los mejores resultados se obtendrán al aplicar sobre malezas en puntas verdes hasta su primer par de hojas. Al aplicar se recomienda usar un volumen de agua que permita obtener un buen cubrimiento de las malezas sensibles. En condiciones de alta presión de malezas use las mayores dosis. No aplicar más de tres veces por temporada. Intervalo de aplicación, cada 7 a 10 días.
Achicoria Industrial (<i>Cicharium intybus</i>)	Altamisa, Bledo, Yuyo, Rábano, Pichoga, Hierba de la culbra, Malva, Manzanilla, Hualputra, Duraznillo, Vinagrillo, Ortiga, Verónica, Viola, Amapola roja, Malvilla, Verdolaga.	20 - 30	Desde 4 a 6 hojas verdaderas del cultivo como mínimo y 10 hojas verdaderas del cultivo como máximo. Distanciar aplicaciones al menos de 7 días y no sobrepasar los 60 gr por temporada. Ideal es no regar antes de 24 horas. Lluvias normales que ocurran a horas de la aplicación no afectará su eficiencia. El herbicida no posee efecto residual, por lo que sólo controla las malezas sensibles presentes al momento de aplicar. Aplicar sobre malezas pequeñas, desde puntas verdes hasta primer par de hojas desarrolladas. No realizar más de dos aplicaciones por hectárea/ año. Usar mayores dosis con mayor presión de malezas. Intervalo de aplicación: cada 7 a 10 días.

APLICACIONES AÉREAS

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS gr/ha	OBSERVACIONES
Remolacha Azucarera.	Altamisa, Bledo, Yuyo, Rábano, Pichoga, Hierba de la culbra, Malva, Manzanilla, Hualputra, Duraznillo, Vinagrillo, Ortiga, Verónica, Viola, Amapola roja, Malvilla, Verdolaga.	40 - 50	Aplicar en post emergencia temprana del cultivo y de la maleza. Mejores resultados se obtienen al aplicar sobre malezas en puntas verdes hasta el primer par de hojas. Se recomienda usar un mojamiento de agua de al menos 40 L/ ha.

Época de Aplicación: En Remolacha Azucarera, en cualquiera de sus estados de desarrollo. En Achicoria Industrial, aplicar entre 4 a 10 hojas verdaderas. Nunca aplicar sobre un cultivo creciendo en condiciones de estrés.

Otras recomendaciones: se recomienda usar **SAFARI® 50 DF** con un surfactante no iónico. En aplicaciones en Remolacha Azucarera, podrá mezclarse junto a otros herbicidas selectivos como Fenmedifan/ Desmedifan/ Etofumesate.

Preparación de la mezcla (Remolacha Azucarera): primero mida la cantidad necesaria de **SAFARI® 50 DF** requerida para la aplicación. Adicione esta cantidad directamente al estanque aplicador a medio llenar y con agitador funcionando, luego agregue la cantidad necesaria de los otros herbicidas con los que se vaya a mezclar y como último paso termine de llenar el estanque aplicador con agua.

Compatibilidades y otras informaciones: **SAFARI® 50 DF** es compatible con los principales herbicidas usados habitualmente en estos cultivos, como Lenacilo, Fenmedifan, Desmedifan, Etofumesate.

Incompatibilidades: como todo herbicida Sulfonilurea, no se recomienda aplicar con insecticidas organofosforados.

Fitotoxicidad: **SAFARI® 50 DF** usado de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta no es fitotóxico al cultivo.

Tiempo de reingreso: Se recomienda esperar al menos 4 horas o hasta que la aplicación se haya secado. No corresponde tiempo de reingreso para animales, ya que los cultivos no son recomendados para uso animal. L/ ha terrestre).

Carencias: 80 días para Remolacha Azucarera y Achicoria Industrial

Volumen de agua: Se recomienda usar un volumen de agua tal que permita obtener un muy buen mojamiento de las malezas (mínimo 200 L/ ha terrestre).

Rotación: Luego de la aplicación de **SAFARI® 50 DF**, si es necesario preparar el suelo y volver a sembrar otro cultivo diferente a Remolacha, se podrá hacer siempre que hayan pasado 30 días desde la aplicación.

