

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Giberelina A₄ y Giberelina A₇ pertenecen al grupo químico de las Giberelinas.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Conservar en su envase original y bajo llave. Es incompatible con bases fuertes y oxidantes energicos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación**, utilice guantes impermeables, botas de goma, overol y protector facial. **Durante la aplicación**, utilice guantes impermeables, botas de goma, overol y protector facial.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina de la aplicación. Aleje animales y personas extrañas.
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

Síntomas de intoxicación: no se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros Auxilios:

"En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo".

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

En caso de Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos Ambientales: No tóxico para peces, aves y abejas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO".
"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el Triple Lavado: Una vez vacío el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de Emergencia:

Sumitomo Chemical Chile S.A.: (56)228350500

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (Atención las 24 horas)

CIITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600.

ProVide® 10 SG

Fitorregulador
Granulado Hidrosoluble (SG)

Fitorregulador que previene el russet fisiológico en manzanos producido por condiciones climáticas.

Composición

Giberelina A4* y Giberelina A7** 10,0% p/p (100 g/kg)
Coformulantes, c.s.p. 100,0% p/p (1 kg)

*Ácido (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilten-2-oxoperhidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxílico

**Ácido (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilten-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxílico

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4.250

Número de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: Gramos

Fabricado para:

Valent BioSciences por:

A to Z Drying Inc, Osage
509 State St, Osage, Iowa 50461
Estados Unidos.

Importado y Distribuido por:
Sumitomo Chemical Chile S.A.
Av. Kennedy 5735, Of 1601
Torre Poniente, Las Condes,
Santiago-Chile
Fono: (56) 228350500

RECOMENDACIONES DE USO: ABRIR AQUÍ



CUIDADO



Instrucciones de Uso

ProVide® 10 SG es un fitorregulador, que actúa previniendo el russet fisiológico en manzanas. Sólo tiene acción sobre el russet producido por condiciones climáticas predisponentes y no actúa sobre el russet producido por otros factores como mecánicos, insectos y productos.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVOS	OBJETIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzanas (variedades susceptibles al russet)	Prevenir el russet fisiológico	200 g/ha	Momento e intervalos de aplicación: Aplicar desde inicio de caída de pétalos y repetir con intervalos de 7 días. Número de aplicaciones: Aplicar 4 veces en la temporada; el número de aplicaciones estará determinado por las condiciones ambientales locales y por el tamaño de los árboles Mojamiento: 1.000 L agua/ha.

Condiciones determinantes para una aplicación segura:

- No mezclar con coadyuvantes (surfactantes, adherentes u otros similares).
- No usar volúmenes superiores a 1000 L agua/ha, ya que el exceso de agua puede producir russet.
- Dirigir el 85% de la aplicación a los 2/3 superiores del árbol.
- Aplicar cuando las condiciones de viento no produzcan deriva.
- Lluvias durante las 6 horas siguientes a la aplicación pueden reducir la actividad de **ProVide® 10 SG**.

Preparación de la mezcla

Prepare una premezcla, disolviendo **ProVide® 10 SG** en un balde con agua. Luego adicione esta mezcla al estanque limpio de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad con el agitador funcionando complete el resto con el agua necesaria. Use la solución preparada dentro de las 24 horas después de la preparación.

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios utilizados en manzanas. Se recomienda realizar pequeñas pruebas de campo antes de la mezcla para aplicación.

Incompatibilidad

No mezclar con coadyuvantes (surfactantes, adherentes u otros similares).

Fitotoxicidad

ProVide® 10 SG no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con lo indicado en la etiqueta.

Tiempo de Reingreso

Para personas 4 horas. Para animales no aplica dado que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo

Período de carencia:

ProVide® 10 SG no está sujeto a períodos de carencias.

Nota al Comprador:

Las recomendaciones de uso así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de pulverización, etc.) pueden afectar el uso.

La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta son de absoluta responsabilidad del usuario.

La compañía garantiza la calidad de la formulación, porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.