

Precauciones y Advertencias:

Grupos químicos: Fludioxonilo pertenece al grupo químico de los fenilpirroles. Ciprodinilo pertenece al grupo químico de las anilinoimidinas y Azufre pertenece al grupo de los calcógenos.

- **durante su manejo:** vestir ropa de protección (durante la manipulación usar guantes impermeables, botas de goma, máscara antipolvo, antiparras y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, máscara antipolvo, antiparras y overol impermeable). No comer, beber ni fumar durante su utilización. Durante la preparación de la mezcla, trabajar en áreas bien ventiladas. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. Observar que el equipo de aplicación esté siempre en condiciones adecuadas de uso y calibrarlo con el producto antes de iniciar un tratamiento. No contaminar aguas o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

- **después de su manejo:** lavarse las manos con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Una vez vacíos los envases, cortarlos o perforarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado, con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar almacenar por encima de 25° C. Mantener el producto alejado del fuego y del calor. No almacenar ni transportar con bebidas, productos alimenticios, medicinas, ropa o cualquier clase de utensilios domésticos. Como el azufre resulta atractivo para los animales, evitar que estos puedan alcanzarlo.

Síntomas de intoxicación: la ingestión de grandes cantidades puede causar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, somnolencia y cianosis.

Primeros auxilios: en caso de sospechar una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios, en caso de: **Inhalación:** llevar al paciente a un área ventilada. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente al médico llevando la etiqueta; **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si las molestias persisten, consultar a un médico; **Contacto con los ojos:** lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 minutos. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente Consultar a un médico o CITUC; **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. Nunca dar nada por vía oral a un paciente inconsciente y mantenerlo acostado de lado. Mantener al paciente abrigado y en reposo.

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión. En casos graves, considerar el suplemento de Tiamina (vitamina B1).

Información para el medio ambiente: tóxico para organismos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA”

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

En caso de **INTOXICACION** llamar al ☎: 2 2635 3800

En caso de **EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME** o **INCENDIO**, llamar al ☎: 2 2247 3600

Consultas a Syngenta S.A.: 2 2941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile

23.03.20

SWITCH® DRY

FUNGICIDA
Polvo Seco (DP)

Composición:

Ciprodinilo *	2,08% p/p (20,8 g/Kg)
Fludioxonilo **	1,39% p/p (13,9 g/Kg)
Azufre	87,84% p/p (878,4 g/Kg)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/p (1 kg)

* 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina.

** 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)pirol-3-carbonitrilo.

INFLAMABLE - CORROSIVO SI ESTA HUMEDO - NO EXPLOSIVO

SWITCH® DRY es un fungicida para aplicación vía espolvoreo, con propiedades de contacto y sistémicas, que le otorgan acción preventiva y curativa para el control de Botritis, Oidio, Pudriciones de post-cosecha y hongos del complejo Pudrición ácida (ver cuadro Instrucciones de Uso) en vides de mesa, vides viníferas y vides pisqueras. Combina las propiedades de tres materias activas, que actúan en forma diferente, disminuyendo así las probabilidades de desarrollo de resistencia. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante los procesos de germinación de conidias, desarrollo del tubo germinativo y penetración y desarrollo del micelio dentro de los tejidos de la planta. Muestra una buena y rápida protección y penetración en las hojas y bayas, por lo cual su actividad sistémica no es afectada por lluvias que ocurran 2 horas después de la aplicación. Tiene buena translocación acropétala y translaminar. No tiene resistencia cruzada con bencimidazoles, dicarboximidias ni triazoles. No es afectado por bajas temperaturas.

Contenido Neto del Envase: 18 kg

“**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2546
Fabricado por:
Quimetal Industrial S.A., Los Yacimientos 1301, Maipú, Santiago, Chile
New Tech Agro S.A., Fundo San José del Boldal Casa 1, Quinahue, Santa Cruz, Chile
Importado y Distribuido por:
Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: 2 2941 0100, Santiago, Chile

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

©: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

syngenta

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar **SWITCH® DRY** de acuerdo a los siguientes programas de tratamientos:

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivos	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Vides de mesa, Vides viníferas y Vides pisqueras	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Oidio (<i>Uncinula necator</i>) y Pudriciones de post-cosecha y hongos del complejo Pudrición ácida: (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Rhizopus stolonifer</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Alternaria alternata</i>)	18 kg/ha	Producto formulado para ser espolvoreado. Se puede aplicar hasta 2 veces por temporada, durante los períodos críticos de control de Botritis, alternando con productos de diferente modo de acción, dentro de un programa de manejo anti-resistencia. En el caso de Oidio aplicar dentro de un programa, alternando con productos de diferente modo de acción, en reemplazo de hasta 2 aplicaciones de azufre, en coincidencia con aplicaciones contra Botritis. En el caso de caso hongos del complejo de Pudrición ácida y Pudriciones de Postcosecha aplicar hasta 2 veces por temporada, dentro de un programa, alternado con productos de diferente modo de acción, en coincidencia con aplicaciones contra Botritis.
			Respetar siempre la dosis por hectárea.

Notas:

- **SWITCH® DRY** aplicado en vides viníferas ofrece un comprobado efecto antilacasa, lo cual mejora la calidad de los vinos.
- **SWITCH® DRY** es ideal para ser utilizado dentro de un programa de manejo para el control conjunto de Botritis y Oidio que incluya a otros fungicidas tales como **SWITCH® 62,5 WG**, **SHIRLAN 500 SC**, **SCORE® 250 EC**, y **TOPAS® 200 EW**.
- En vides viníferas y pisqueras se recomienda consultar con su enólogo una posible interferencia del azufre con el proceso de fermentación del mosto.
- Como Syngenta, además de **SWITCH® DRY**, dispone de otras formulaciones de **SWITCH®**, tales como **SWITCH® PREMIUM** y **SWITCH® 62,5 WG**, se recomienda no realizar en total más de 2 aplicaciones en la temporada que incluyan estos productos.

Importante:

- No realizar los tratamientos durante las horas de mayor calor o insolación.
- No aplicar con temperaturas de 30°C o superiores.
- Dirigir siempre las aplicaciones al follaje y asegurar un buen cubrimiento y penetración en los racimos, eligiendo previamente el equipo espolvoreador más adecuado.
- Aplicar en horas de poco viento para evitar deriva.

Método de preparar la mezcla: calibrar correctamente el equipo aplicador con el producto antes de iniciar un tratamiento. Luego, agregar la cantidad necesaria de **SWITCH® DRY** al estanque del equipo azufrador o espolvoreador. Mantener la agitación durante toda la aplicación.

Incompatibilidad: **SWITCH® DRY** no se aplica en mezcla con otros productos. Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas de **SWITCH® DRY** con productos no específicamente recomendados en esta etiqueta.

Fitotoxicidad: si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

Período de carencia: en vides se recomienda dejar un intervalo de 2 días entre la última aplicación y la cosecha.

Importante: La información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral. Para cualquier información respecto a Límites Máximos de Residuos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.



CUIDADO

