

FUNGICIDA

# TERCEL DRY

POLVO SECO (DP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2615

TERCEL DRY, es un fungicida efectivo en el control de botritis y pudrición ácida en Vides.

## COMPOSICIÓN:

Iprodiona (*) .....	5,3% p/p (53 g/kg)
Coformulantes c.s.p. ....	100% p/p (1 kg)

(\*) 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioximidazolidina-1-carboximida

## << LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.  
Almirante Pastene 300  
Providencia - Santiago

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A.**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
Lampa, CHILE



**QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.**

Ruta 5 Sur km 135, San Fernando, Chile



**NTA**  
New Tech Agro

**NEW TECH AGRO**

Fundo San José del Boldal S/N  
Quinahue, Santa Cruz, Chile

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TERCEL DRY, es un fungicida cuyo ingrediente activo Iprodiona pertenece al grupo químico de las dicarboximidias. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la nube del espolvoreo. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TERCEL DRY, es ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos, y prácticamente no tóxico para abejas y aves.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:** En caso de contacto con la piel: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten, busque a un médico. En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con agua corriente fría, por al menos durante quince minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si la irritación persiste consultar un especialista. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, busque o solicite inmediata atención médica. En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

**Síntomas probables:** posible irritación ocular, diarrea y otros síntomas inespecíficos.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA), (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve TERCEL DRY, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

## CUIDADO



# INSTRUCCIONES DE USO

**TERCEL DRY**, es un fungicida de contacto, que actúa preventivamente, controlando eficientemente botritis y pudrición ácida, en Vides.

## Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
<b>PARRONALES Y VIÑAS</b>	Botritis Pudrición ácida ( <i>Botritis</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Rhizopus</i> , <i>Cladosporium</i> )	20	Aplicar vía espolvoreo después de una lluvia, o bien con condiciones que sean favorables para el desarrollo de las enfermedades. Aplicar en forma alternada hasta dos veces por temporada, desde cierre de racimo a cosecha, para reducir el riesgo de resistencia de <i>Botrytis cinerea</i> .	3

### Observaciones:

- El equipo de aplicación debe calibrarse adecuadamente para que efectivamente aplique la cantidad recomendada por hectárea.
- Controla razas del hongo *Botrytis* sp. resistentes a funguicidas del grupo Benzimidazoles.
- Debe alternarse con productos de diferente composición química y distinto modo de acción, a fin de evitar eventual resistencia de los hongos al fungicida.

### Preparación de la mezcla:

El producto se aplica directamente sobre los cultivos.

### Compatibilidad:

**Tercel Dry** se aplica solo.

### Incompatibilidad:

**TERCEL DRY** es incompatible con los productos de reacción alcalina. Además es incompatible con productos que se aplican vía líquida

### Fitotoxicidad:

No causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de esta etiqueta.

### Tiempo de reingreso:

Esperar 4 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal. No corresponde reingreso de animales ya que el cultivo en que se recomiendan no tiene como objetivo la alimentación animal.

## CUIDADO

